

Fertilizante
MULTI-K CLASSIC
PARA APLICACIONES FOLIARES Y POR FERTIRRIGACIÓN

Inscripto en SENASA N° 10.004

Contenido Neto 25 kg

Origen: Israel

NITRATO DE POTASIO

Riqueza garantizada:

Nitrógeno total..... 13,2%

Potasio soluble.....38,3%

Grado: 13 – 0 - 38

Grado equivalente: 13 - 0 – 46

Solubilidad: 1/3 (libremente soluble)

Registrado por:

BROMETAN S.R.L

Buenos Aires 2170 esq. Cuyo,

Parque Industrial Burzaco

(1852) – Burzaco Prov. de Bs. As.

Tel: 4299-1888

**Se recomienda su uso en cultivos de: TABACO – ALGODÓN – TE – BANANO
– VIÑAS – PARRALES – HORTICOLAS – FRUTALES - FLORALES**

- ASEGURAR ADECUADA VENTILACIÓN
- NO ALMACENAR CON COMBUSTIBLES, PRODUCTOS CORROSIVOS O INFLAMABLES NI CON MATERIALES ORGÁNICOS.
- NO FUMAR

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN MADRE:

En aplicaciones por riego deben mezclarse la cantidad de MULTI-K Classic a utilizar en 50 litros de agua, agitar e incorporar dicha solución nutritiva al tanque fertilizador del equipo de riego. La solubilidad de MULTI-K Classic aumenta en función de la temperatura del agua. Con la disolución de MULTI-K Classic se provoca una disminución de la temperatura del agua, por lo que a veces puede precisarse algunos minutos para que nifofol se diluya totalmente. El volumen de agua por hectárea puede variar entre los 400 a 100 litros. La conductividad eléctrica de la solución nutritiva del suelo no debe superar los 2 decisiemens/m. La dosificación dependerá del tipo de suelo o sustrato, estado de desarrollo del cultivo, clima, etc., por lo que es aconsejable el seguimiento del estado nutricional del cultivo a través de análisis foliares y del asesoramiento de un profesional idóneo.

RECOMENDACIONES PARA APLICACIONES POR FERTIRRIEGO				
TOMATE: 6.0 kg/ha/día	PIMIENTO: 4.0 kg/ha/día	PEPINO: 7.5 kg/ha/día	MELON: 3.7 kg/ha/día	VERDURA DE HOJA: 1.0 kg/ha/día
CULTIVOS	DOSIS kg/100 L de agua	MOMENTO DE APLICACIÓN		
TABACO	1,0	Iniciar 20 días después del trasplante. Repetir 2 o 3 aplicaciones con intervalos de 20 o 25 días hasta 30 días antes de la cosecha.		
ALGODÓN	1,0	Iniciar antes de la floración. Repetir cada 20 días hasta antes que comiencen a abrirse las cápsulas.		
TE	1,0	Después de cada poda de formación y después de cada cosecha		
BANANO	1,0-2,0	Iniciar antes de la formación de las yemas florales. Repetir una vez por mes hasta después de formarse el fruto		
VIÑAS	0,5-0,8	Completada la 1ra brotación, hacer 2 aplicaciones con intervalos de 20 días		
PARRALES	0,8-1,0	Hasta fines de diciembre 3 aplicaciones con intervalos de 20 días		
TOMATE-PIMIENTO-AJI-BERENJENA	1,0-1,5	15 días después del transplante y repetir cada 20 días hasta finalizar la floración		
PAPA	1,0-1,5	1ra aplicación después del aporque. 2da antes de la floración. Repetir cada 20 días hasta que el tubérculo tenga la mitad del tamaño normal		
CEBOLLA-AJO-ZANAHORIA-NABO-APIO-REMOLACHA	2,0	Iniciar con plantas de 15 cm de altura y repetir cada 20 días		
BATATA	1,0	15 días después del transplante y repetir cada 30 días hasta la cosecha		
ARVEJA-POROTO-LENTEJA-GARBANZO	1,0	1ra aplicación cuando comienzan a extenderse las guías, 2da antes de la floración, 3ra a mitad del tamaño de las vainas		
SANDIA-MELON-ZAPALLO-ZAPALLITO-PEPINO	1,0-1,5	Comenzar cuando las guías tengan 20 cm, luego repetir cada 15-20 días hasta tamaño normal de los frutos		
FRUTILLA	0,5-2,0	Después del transplante y repetir en cada floración		
REPOLLO-COLIFLOR-COLZA	0,5-2,0	Comenzar antes de la formación de las cabezas. Repetir 1-2 veces cada 20 días		

LECHUGA-ESPINACA- ACELGA	0,5-1,0	En plena vegetación, cada 20 días hasta el corte
CITRUS	2-3	(formación 1-5 años): Desde que se inicia el crecimiento primaveral, después de la floración, cuando las hojas hayan alcanzado 2/3 de su tamaño, Según el estado del cultivo puede ser necesario más de una aplicación con intervalos de 20 días
	2-6	(en producción): Desde que se inicia el crecimiento primaveral, después de la floración, cuando las hojas hayan alcanzado 2/3 de su tamaño. Según el estado del cultivo puede ser necesario más de una aplicación con intervalos de 20 días
MANZANO-PERAL	0,5-1	(en formación): 3 aplicaciones cada 20 días desde que se inicia el crecimiento primaveral
CIRUELO	0,8-1,25	(en producción): 4 o más aplicaciones cada 15-20 días. Desde la caída del 50% de los pétalos hasta fines de diciembre
DURAZNERO	10	3 semanas antes de la fecha prevista para apertura normal de las yemas, para quebrar su dormancia
	5	Al final del período de reposo, para recuperación de daños por frío invernal
OLIVO-NOGAL	2,0	Al iniciarse la brotación de primavera. Repetir después del cuaje y luego otra aplicación cuando en fruto tiene $\frac{1}{4}$ del tamaño normal
FLORES	0,5-1,0	(Rosas, Claveles, Gladiolos, Crisantemos, etc.): Después del trasplante o plantación hasta la floración efectuar aplicaciones cada 10-15 días

INCOMPATIBILIDADES: Este es un producto incompatible con: Urea, Cianamida de calcio, Escorias thomas, Hiperfosfato y Cal.

PRECAUCIONES DE USO: No dejar los envases abiertos, pues este producto se humedece en contacto con el aires. La presencia de terrones es normal y no interfiere con la normal solubilidad del producto. **Las aplicaciones foliares y por fertirriego son un complemento y no un sustituto de las fertilizaciones al suelo.**

EN APLICACIONES FOLIARES NO PULVERIZAR EN HORAS DE ALTA INSOLACIÓN O ELEVADAS TEMPERATURAS