

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR EN ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. Evitar su inhalación. Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas de goma, ropa protectora adecuada, máscara, anteojos y protector respiratorio. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lavar cuidadosamente con jabón y agua abundantes, las partes del cuerpo expuestas al producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves. Prácticamente no tóxico para peces. No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación. Virtualmente no tóxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, áreas no cultivadas ni pastoreadas, siempre y cuando estén alejados de centros poblados y lugares de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35°C.

DERRAMES: Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Contener el derrame evitando la contaminación de canales y superficies de agua. Absorber el producto derramado con un material inerte no combustible (como tierra, arena o arcilla) y transferirlo a contenedores adecuados para su disposición final. Lavar las áreas contaminadas con agua y detergente. No contaminar el medio ambiente.

PRIMEROS AUXILIOS: En todos los casos, procurar asistencia médica y mostrar la etiqueta del producto.

Mientras tanto, tomar las siguientes medidas: En caso de ingestión: Lavar la boca con abundante agua. No suministrar leche, aceite ni sustancia grasa alguna. No administrar nada por boca a una persona inconsciente. Procurar atención médica inmediata. Contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel y cabellos con abundante agua y jabón neutro o agua bicarbonatada (diluir una cucharada sopera de bicarbonato de sodio en un litro de agua) durante al menos 15 minutos. Contacto ocular: Inmediatamente lavar los ojos con agua limpia en forma continuada durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos para ayudar a lavar el material. En caso de inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y fuera del área contaminada. Aflojar las ropas ajustadas (cinturón, cuello) para que pueda respirar sin dificultad. Mantener a la persona quieta y acostada, cuidando que la boca y nariz estén libres de obstáculos. Mantener el cuello en forma extendida para dejar libre el tracto respiratorio.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro (CLASE IV).

Toxicidad inhalatoria: Categoría inhalatoria IV. Irritación dérmica: No irritante. Irritación ocular: No irritante. Sensibilización dérmica: Sensibilizante. No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: En caso de ingestión, posible diarrea, en caso de contacto con piel u ojos, posible irritación.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

- Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. R. Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 y 4658-7777
- Hospital Municipal de Infantes de Córdoba. Tel.: (0351) 471-8785 y 471-8165
- Centro Toxicológico del Htal de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806 int. 480
- Centro de Consultas Toxicológicas (las 24 hs.). Tel.: (0341) 424-2727

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o actividad en mezcla con otros fungicidas.

NEMATOCIDA BIOLÓGICO

ENDURO®

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Bacillus thuringiensis aislado CNPSo 3915, *Bacillus velezensis* aislado CNPSo 3602, *Bacillus amyloliquefaciens* aislado CNPSo 3202 2x10⁸ UFC/mL*
Coadyuvantes y solventes c.s.p 100mL

*1x10⁸ UFC/mL al vencimiento (24 meses)

“LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES
UTILIZAR EL PRODUCTO”

INSCRIPTO EN EL SENASA CON EL N°: 42.589-BIO



COD. PRODUCTO: 67457
LOTE: 10040010CD
FECHA ELABORACION: 14/05/2026
FECHA VENCIMIENTO: 13/05/2028

CONTENIDO: 1L

NO INFLAMABLE

ORIGEN: BRASIL

REGISTRANTE:

Brometan
HAY OTRA FORMA

BROMETAN S.R.L.
Zapola 4248, 2° piso oficina C. - CABA
Tel.: +54 9 11 2641-7881
www.brometan.com.ar

NOTA: La Compañía fabricante y el registrante no aceptan ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las recomendaciones de uso indicados en este marbete.

GENERALIDADES:

ENDURO es un nematocida biológico a base de *Bacillus thuringiensis*, *Bacillus velezensis* y *Bacillus amyloliquefaciens*. La combinación de *Bacillus* promueve una acción sinérgica, combinando la protección física de las raíces, la inhibición de la eclosión de huevos y la acción directa sobre los nematodos, proporcionando un control efectivo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Las raíces son susceptibles al ataque de nematodos cuando son nuevas. Con ENDURO buscamos controlar un buen porcentaje de raíces nuevas (idealmente 70%, nunca menos del 50%), de manera que las bacterias formen su biofilm sobre ellas, evitando así el ataque de los nematodos.

Dependiendo del cultivo, la aparición de nuevas raíces puede ser constante o sufrir variaciones a lo largo del tiempo. En este último caso, aplicando ENDURO en los momentos de mayor crecimiento radicular (floración y postcosecha en vid), estaremos protegiendo un alto número de raíces. Si la aparición de raíces fuera más constante, debemos aplicarlo regularmente, con intervalos de 14 a 21 días (tomate). El volumen aplicado dependerá del volumen de raíces que deseamos alcanzar con la solución. Los resultados son muy convincentes aplicando una solución que tenga entre 800 y 1000 ppm de producto.

Luego de aplicada la solución, debemos agregar un volumen de agua similar para incorporar levemente ENDURO hasta la zona de las raíces.

RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
<i>Meloidogyne incognita</i> <i>Nacobbus aberrans</i>	2 - 2.5 L/ha	De 4-6 aplicaciones en el ciclo. Primera aplicación al momento del trasplante o a no más de 7 días de realizado el mismo. Reaplicar cada 14-21 días.

RESTRICCIONES DE USO:

Periodo de carencia: Exento.

Tiempo de reintegro al área tratada: No entre en la zona donde se ha aplicado el producto antes de que la mezcla se haya secado completamente (al menos 24 horas después de la aplicación). Si necesita entrar antes de este tiempo, utilice el equipo de protección individual (EPI) recomendado para su uso durante la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Si bien la formulación es compatible con productos coadyuvantes y fertilizantes, se recomienda no mezclar con plaguicidas químicos en el mismo tanque, pero sí como parte del manejo integrado de plagas.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxica en las dosis y momentos de aplicación recomendados.

CONSULTE CON UN/A INGENIERO/A AGRÓNOMO/A.



CUIDADO