



AGRINOVO®

Insecticida sistémico
a base de spirotetramat

**Manejo de plagas
en diferentes cultivos agrícolas**

www.brometan.com.ar

Seguinos en:  brometan s.r.l.  Brometanred




Descripción del producto

AGRINOVO es un insecticida sistémico a base de spirotetramat, perteneciente al grupo de los inhibidores de la biosíntesis de lípidos.

Actúa principalmente por ingestión y se caracteriza por su doble sistemía, moviéndose dentro de la planta a través del xilema y el floema.

Modo de acción

- Actúa por ingestión
- Inhibe la biosíntesis de lípidos en insectos
- Afecta estadios inmaduros
- Control gradual y sostenido



Modo de uso

Los productos a base de spirotetramat presentan mayor eficacia cuando se aplican en etapas tempranas de la infestación, con el cultivo en crecimiento activo.

Plagas objetivo y momento de aplicación

- Pulgones
- Mosca blanca
- Cochinillas
- Otras plagas chupadoras



Comentario Técnico

No recomendado como producto de rescate ante infestaciones avanzadas.

Comentario Técnico

- Integración con otros insecticidas
- Alternancia de modos de acción
- Contribuye al manejo de resistencias
- Complemento de productos de contacto

Recomendaciones de uso

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS (cm3/hl)	MOMENTO DE APLICACIÓN
DURAZNERO NECTARINA CIRUELO	Pulgón verde del duraznero (<i>Myzus persicae</i>)	50	Aplicar en forma temprana, después de la caída de pétalos y con la aparición de los primeros pulgones. AGRINOVO actúa en forma lenta y presenta un largo poder residual.
MANZANO	Piojo de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	50 - 70	Aplicar en forma temprana, con suficiente follaje, antes que se den los nacimientos de ninfas de la primera generación, o bien de acuerdo al servicio de alarma
	Pulgón Lanígero (<i>Erisoma lanigerum</i>)	50 - 70	Aplicar en forma temprana, preventivamente, con suficiente follaje, en plantas con pie susceptible o al observar las primeras colonias aéreas. Por su doble sistemía AGRINOVO tiene control sobre pulgones que se encuentran en las agallas radicales, para ello emplear la mayor dosis.
PERAL	Cochinilla Harinosa (<i>Pseudococcus viburni</i>)	70	Realizar 1 aplicación en forma temprana en cuaje de frutos hasta fruto chico, esto es generalmente entre mediados de octubre - principios de noviembre antes de que se produzca la migración de las primeras ninfas móviles, de la primera generación, hacia los brotes y frutos.
PIMIENTO	Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>)	50	Aplicar en aspersión foliar al observar la presencia de la plaga
	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	+60	Aplicar en aspersión foliar al observar la presencia de la plaga o cuando se supere el umbral de 5 ninfas por folíolo. Por su doble sistemía AGRINOVO actúa mayormente a nivel de ninfas.
TOMATE	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Mosca blanca de los invernaderos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	60	Aplicar en aspersión foliar al observar la presencia de la plaga o cuando se supere el umbral de 5 ninfas por folíolo. Por su doble sistemía AGRINOVO actúa mayormente a nivel de ninfas.
UVA DE MESA Y UVA DE VINO	Cochinilla Harinosa de la vid (<i>Planococcus ficus</i>)	70 - 90	Aplicar preferentemente en forma temprana entre el periodo de floración a cuaje, cuando se producen las migraciones de las ninfas móviles hacia la base de los pitones y brotes nuevos. Se recomienda la mayor dosis para las variedades más tardías, a fin de lograr la residualidad necesaria.